

# 雄性激素

Testosterone (Andriol®), Mesterolone (Provironum®)

---

## 病人须知

此册为您解答一些对于此药物的疑问，并不完全详载此药之全部资料，若有任何疑问可请教医生或药剂师。

## 这药的作用是什么？

这是人体所制造的男性荷尔蒙。此药是用来补充身体所需的份量，刺激男性的发育，增加精子的产量和治疗某些乳房病症。

## 什么时候服药？

请按照医生或药剂师的指示来服药。此药应在饭后服食。

## 怎样用药？

此药有可供服食的药片，以及注射入身体的药剂。

## 若忘记服药该怎么办？

若忘了服一剂药，再想起时应即补服。若在该服下一剂药时再想起漏了一剂药，就不必补服，只要照常按时服下一剂药。勿同时服双倍剂量。

## 服药后会引起什么副作用？

服食此药后可能引起下列的副作用：

- 恶心
- 便秘
- 肠胃不适
- 肚痛气胀
- 暂失胃口
- 性欲的转变

在身体适应了药性后，上述副作用可能逐渐消失。但若有关症状持续或无法忍耐，便应通知医生。

## 在服药期间要注意什么事项？

若肤色转黄，或有恶心、呕吐、手指和足踝肿胀的现象，就应该通知医生。

女性服用者若有下列的现象就应该通知医生：

- 声音转沙哑低沉
- 不寻常的脱发或毛发生长过多
- 生暗疮
- 月经失常

糖尿病患者服食此药，若发觉其血液和尿糖的检验报告有变化，应向医生报告。

## 怎样贮藏此药？

把药存放在室内阳光晒不到及儿童拿不到的地方。



Version 1

Last Review: 01/09/2014

Produced by Department of Pharmacy

KK Women's and Children's Hospital

**PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®**