

# TOPIRAMATE (托比酯)

TOPAMAX® (妥泰)

---

## 病人须知

此册为您解答一些对于药物的疑问，并不完全详载此药之全部资料，若有任何疑问，可请教医生或药剂师。

## 此药有什么用途？

Topiramate 用于控制癫痫或惊风发作，也可用于神经系统的其他病例。

## 何时服用此药？

- 通常每日口服两次。刚开始服药时，医生会用较低的剂量，然后逐步地将剂量增加。请遵守标签上的指示，若有疑问，请向药剂师或医生询问。
- 在未经过医生的同意之前，请勿自行调整剂量或停止服药。突然停止服用此药会导致惊风症状不受控制。
- 若无医生同意，请勿擅自更换药物品牌或剂型。

## 如何服用此药？

将整粒药片与一杯开水吞服。若您的小孩不能吞服药片，可将药片磨成粉，然后把药粉加入少许的食物里（比如：雪糕、乳酸菌饮料或糖浆）让孩子服用。此药可与食物一起服用或空肚服用。

## 忘记或漏服药该怎么办？

- 立即补服药物。若已接近下次服药的时间，不必补服而依照下次服药的时间服药。
- 勿连服两剂或自行增加剂量。
- 若孩子漏服两剂或以上的药物或您不清楚该怎么做，请向您的医生或药剂师询问。
- 若您孩子只剩两星期或更少的药量，请确保您已安排孩子下一次的复诊，或已得药单准备往药房购买药物。

## 此药会引起什么副作用？我该怎么应付这些副作用？

常见的副作用通常会在孩子开始服药期间出现。常见的副作用包括：

- 嗜睡，头晕，疲倦，注意力无法集中  
若服用其他药物要特别小心，伤风感冒药可能加重嗜睡的副作用。孩子进行骑轿车或其他类似活动时，家长必须谨慎督促。

- 食欲不振或体重减少（暂时性），恶心，呕吐，消化不良，腹泻，味觉转变  
若觉得肠胃不适，药物可与食物一起服用，但勿用汽水服药。
- 少汗，体温增加  
您须确保孩子在运动时或热天气的时候多喝开水。
- 行为性情转变如抑郁，激动，焦虑，多动，记忆力减退，语言障碍
- 手脚麻痹，肌肉协调差，肌肉乏力或酸痛
- 视线模糊或复视

若以上副作用在几天后仍没有消失，或影响孩子的日常生活，请告知医生。

此药可能导致一些罕见但严重的副作用。若出现以下副作用，请立即通知医生或到急诊部求医：

- 日益恶化的讲话和语言技能
- 小便时疼痛、小便出血、尿液突然减少或腰部疼痛
- 突然视线模糊、红眼或眼睛疼痛
- 不寻常的行为变化
- 淤血，或不寻常的出血，持续发烧，喉痛，口疮
- 红疹

若服用药后出现其他不寻常的现象，请告知医生。若对于孩子服用药物有任何疑问或困难，请与您的医生交谈或讨论。

## 其他资讯

若小孩有肾结石的家族病史，请您将此事通知医生。若您孩子在服用此药时，患上腹泻、呕吐时，应确保孩子补充水分。

若小孩对磺胺(sulphonamide)过敏，请您通知医生。

在让孩子服用其他药物、补充品或草药前，请告知医生或药剂师。

若孩子由于任何原因必须向其他医生求诊，请告知他孩子在服用此药物。



Version 1

Last Review: 01/08/2014

Produced by Department of Pharmacy

KK Women's and Children's Hospital

**PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®**