

SODIUM VALPROATE

（丙戊酸钠）

EPILIM[®]（抗癲灵/艾匹灵）

病人须知

此册为您解答一些对于此药物的疑问，并不完全详载此药之全部资料，若有任何疑问可请教医生或药剂师。

此药有什么用途？

Sodium valproate 用于控制癲痫或惊风发作，也可用于神经系统的其他病例。

何时服用此药？

- 通常每日口服二至三次。刚开始服药时，医生会用较低的剂量，然后逐步地将剂量增加。请遵守标签上的指示，若有疑问，请向药剂师或医生询问。
- 在未经过医生的同意之前，请勿自行调整剂量或停止服药。突然停止服用此药会导致惊风症状不受控制。
- 若无医生同意，请勿擅自更换药物品牌或剂型。

如何服用此药？

□ 药水

服用前将药水摇匀。请用药房提供的茶匙或注射管喂药。勿用家用汤匙量药水，因为家用汤匙不能准确地量出剂量。请勿与汽水一起服用，因为这将造成喉、胃不适。

□ 肠溶片(比如：Epilim[®] EC)

这种特别剂型能防止此药刺激肠胃。将整粒药片与一杯开水吞服，勿将药片咬碎或磨碎。

□ 控释片(比如：Epilim[®] Chrono)

这种特别剂型能在固定的时间内让药物慢慢地释放，因此能减少服用药物的次数。应将整粒药片与一杯水吞服。您只能将 Epilim[®] Chrono 500mg 药片折半，再让孩子服下。勿将药片咬碎或磨碎。

忘记或漏服药该怎么办？

- 立即补服药物。若已接近下次服药的时间，不必补服而依照下次服药的时间服药。
- 勿连服两剂或自行增加剂量。
- 若孩子漏服两剂或以上的药物或您不清楚该怎么做，请向您的医生或药剂师询问。

- 若您孩子只剩两星期或更少的药量，请确保您已安排孩子下一次的复诊，或已得药单准备往药房购买药物。

此药会引起什么副作用？我该怎么应付这些副作用？

常见的副作用通常会在孩子刚开始服药时出现。常见的副作用包括：

- 轻微恶心、呕吐、消化不良、腹痛、腹泻或食欲不振
若觉得肠胃不适，药物可与食物一起服用，但勿与汽水服药。
- 脱发（短暂性），月经不调，痛经，食欲和体重增加
- 头晕、视线模糊、复视
- 疲劳、失眠、情绪紧张、不寻常的行为转变如易怒、激动、抑郁
若服用其他药物要特别小心，伤风感冒药可能加重嗜睡的副作用。孩子进行骑脚
车、游泳或其他类似活动时，家长必须谨慎督促。
- 震颤、肌肉乏力、关节或肌肉疼痛、肌肉协调差

若以上副作用几天后仍没有消失，或影响孩子的日常生活，请告知医生。

此药可能导致一些罕见但严重的副作用。若出现以下副作用，请立即通知医生或到急
诊部求医：

- 皮肤或眼睛泛黄（黄疸）、严重腹痛、呕吐
- 严重皮疹，皮肤发红、发痒或脱皮
- 不寻常的出血或淤血、持续发烧、喉咙痛、口疮
- 日益恶化的或不寻常的行为变化

若服用药后出现其他不寻常的现象，请告知医生。若对于孩子服用药物有任何疑问或
困难，请与您的医生交谈或讨论。

其他资讯

在让孩子服用其他药物、补充品或草药前，请告知医生或药剂师。
若孩子由于任何原因必须向其他医生求诊，请告知他孩子在服用此药物。



Version 1

Last Review: 01/08/2014

Produced by Department of Pharmacy
KK Women's and Children's Hospital